

Karta obserwacji wkluc obwodowych

Oddział _____

Imię i nazwisko pacjenta _____ Nr historii choroby _____

Lp.	Miejsce wkłucia i typ kaniulacji	Data i godz. założenia	Podpis Osoby Wykonującej Zabieg	Doba	Obserwacja miejsca wkłucia (objawy w skali 0-5)						Data i godzina usunięcia kaniuli	Podpis	Uwagi
					0	1	2	3	4	5			
1				1	*R								
					*P								
				2	*R								
					*P								
				3	*R								
					*P								
2				1	*R								
					*P								
				2	*R								
					*P								
				3	*R								
					*P								
3				1	*R								
					*P								
				2	*R								
					*P								
				3	*R								
					*P								

* 0 Miejsce założenia kaniuli bez zmian.

1 Wystąpienie co najmniej jednego z wymienionych objawów: słaby ból w okolicy wkłucia, lekkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia.

2 Wystąpienie co najmniej dwóch z wymienionych objawów: ból w okolicy miejsca wkłucia, rumień, obrzęk.

3 Wystąpienie następujących objawów: ból wzdłuż kaniuli, stwardnienie w okolicy miejsca wkłucia.

4 Wystąpienie następujących objawów nasilających się: ból żyły na całej długości kaniuli, zaczerwienienie, namacalne stwardnienie żyły poza końcówką kaniuli.

5 Wystąpienie następujących objawów nasilających się: ból żyły na całej długości kaniuli, zaczerwienienie, twardy naciek w okolicy wkłucia, namacalne, stwardnienie żyły poza końcówką kaniuli, gorączka.

R - rano, P - popołudniu.

Kryteria oceny zapalenia żył

PUNKTACJA OBJAWY	UWAGI / ZLECENIA
+0 Miejsce złożenia kaniuli bez zmian	Nie ma zapalenia żyły
+1 Stwierdzenie co najmniej jednego z niżej wymienionych objawów: — słaby ból w okolicy wkłucia — lekkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia	Obserwacja kaniuli Prawdopodobieństwo pierwszych objawów zapalenia żyły
+2 Stwierdzenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych objawów: — ból w okolicy miejsca wkłucia — rumień — obrzęk	Obserwacja wkłucia Wczesne stadium zapalenia żyły Zmienić miejsce wkłucia
+3 Stwierdzenie następujących objawów: — ból wzdłuż kaniuli — stwardnienie w okolicy miejsca wkłucia	Zapalenie żyły Zmienić miejsce wkłucia Rozważyć możliwość leczenia
+4 Stwierdzenie nasilających się objawów: — ból żyły na całej długości kaniuli — zaczerwienienie — namacalne stwardnienie żyły poza końcówką kaniuli	Zaawansowane stadium zapalenia żyły lub początek zakrzepowego zapalenia żyły Rozważyć możliwość leczenia Zmienić miejsce wkłucia
+5 Stwierdzenie nasilających się objawów: — ból żyły na całej długości kaniuli — zaczerwienienie — twardy nacisk w okolicy wkłucia — namacalne stwardnienie żyły poza końcówką kaniuli — gorączka	Zaawansowane stadium zakrzepowego zapalenia żyły Włączyć leczenie Zmienić miejsce wkłucia