

## STAN NEUROLOGICZNY

Czaszka: wygląd i budowa  
obmacywaniem  
opukiwaniem  
przysłuch

Objawy opłótniane: sztywność karku  
Objawy Kerniga

### Nerwy czaszkowe:

I węch

II ostrość wzroku  
pole widzenia (orientacyjne)  
dno oczu

III, IV, VI: gałki osadzone  
ustawienie  
szpary powiekowe  
ruch gałek  
oczopląs  
żrenice: kształt  
wielkość  
oddziaływania

V. czucie na twarzy  
odruchy rogówkowe  
odruchy spojówkowe  
żwacze napina  
odruch żuchwowy

VII: marszczy oczy  
zaciska oczy  
faldy nosowo - wargowe  
szczerzy zęby

VIII: ostrość słuchu                      próba Rinnego  
próba Webera

XI, X: podniebienie miękkie  
języczek  
odruchy podniebienne              odruchy gardłowe  
polykanie                              tonacja

X: skręt głowy  
unoszenie barków

XII, język                              ruchy na boki  
zaniki                                    drżenia

Tulów:

odruchy brzuszne

czucie:

Kręgosłup: ustawienie

ruchomość

bolesność

objaw szczytowy

### Kończyny górne

Wygląd:

ruchy mimowolne

ułożenie

napięcie

ruchy bierne

ruchy czynne

siła mięśniowa

Odruchy: ze ścięgna m. trójkłowego

prawy lewy

ze ścięgna dwugłowego

prawy lewy

z kości łokciowej

prawy lewy

z kości promieniowej

prawy lewy

Odruchy patologiczne:

czucie powierzchniowe

ruchy naprzemienne

zbiorność

czucie głębokie

mijanie

### Kończyny dolne:

Wygląd:

ruchy mimowolne

ułożenie

napięcie

ruchy bierne

ruchy czynne

siła mięśniowa

Odruchy:

kolanowe

prawy lewy

skokowe

prawy lewy

podeszwowe

prawy lewy

Odruchy patologiczne:

obj. Babińskiego

prawy lewy

obj. Rossolimo

prawy lewy

obj. Laseque'a

prawy lewy pr. Romberga

czucie powierzchniowe

czucie głębokie

zbiorność

Chód: